

Comparación de costes en dos modalidades de rehabilitación en prótesis de rodilla: domiciliaria vs hospitalaria.

Antonio López Villegas ^{a,b}, Carlos Martín Saborido ^d, Daniel J. Catalán Matamoros ^a, Jesús Vita Martínez ^c, Remedios López-Liria ^a, M^a Ángeles Iniesta Bonillo ^c.

^a Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Almería. Almería, España.

^b Aprovisionamiento y Logística. Hospital de Poniente. Almería, España.

^c Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Almería. Almería, España.

^d EUEF San Juan de Dios-Universidad Pontificia Comillas. Madrid, España..

Objetivos

Averiguar si existen diferencias entre los costes originados por la rehabilitación domiciliaria versus hospitalaria en el proceso de recuperación de prótesis de rodilla.

Metodología

Comparación de costes en una muestra de 88 pacientes divididos en dos grupos: tratamiento domiciliario y tratamiento hospitalario, entre 2008 y 2009 en el servicio Andaluz de Salud (SAS). Éstos se evaluaron mediante cálculo microcoste: personal, transporte e instalaciones/material, utilizando el programa de análisis de costes por servicios denominado, Sistema de Control de Gestión Hospitalaria del SAS.




Figura A: Media del coste de los consumos comunes.




Figura B: Ratio del coste de cada consumo según el coste total en cada modalidad de tratamiento (en %).

Conclusiones

La rehabilitación en el hospital resultó ser la modalidad de mayor coste, coincidiendo con la mayoría de las conclusiones de otros estudios internacionales.

El tratamiento domiciliario de los pacientes es una actividad más económica que, habría que considerar a la hora de asignar recursos sanitarios a ciertos procesos patológicos.



Resultados

No hubo diferencias significativas entre los dos grupos de pacientes respecto a la edad, estancia hospitalaria y el número de sesiones recibidas según el tipo de rehabilitación asignada. El coste medio por paciente fue de 412,51 € (DE ± 141,72) para los pacientes tratados en su domicilio y de 582,86 € (DE ± 150,38) para los que recibieron la rehabilitación en el hospital.

Se han encontrado diferencias significativas ($p < ,001$) entre ambas modalidades de tratamiento. La opción terapéutica domiciliaria resulta un 29,23% más económica que la hospitalaria.

